

MRT-artrografia

Liigese magnetuuring kontrastainega

Ettevalmistuste tõttu saabuge uuringule **30 minutit enne broneeritud aega**.
Uuring kestab 30-60 min.

Enne uuringut

- Saate süüa ja juua tavapäraselt ja võtta igapäevaselt tarvitavad ravimid
- Ärge paigaldage ravimplaastrit (nt nikotiinplaaster, valuvaigistiplaaster)
- Ehted ja needid tuleb ära võtta, parem on need jätta koju
- Pange selga midagi kerget ja mugavat, mida on lihtne ära võtta

Uuringu ajal

Enne uuringut süstib radioloog liigesesse ultraheli kontrolli all kontrastainet.

Magnetuuringul (MRT) saadakse inimkehast täpseid anotoomilisi kujutusi tugeva magnetvälja abil. Uuringuks ei kasutata ioniseerivat ehk röntgenkiirgust. Uuring on valutu ja võimaldab diagnoosida mitmeid haigusi. Uuring teostatakse tunnelilaadses seadmes, mis on mõlemast otsast avatud, ventileeritud ja valgustatud ruum.

NB! Kui Teil on klaustrofoobia ehk kinnise ruumi kartus või ärevus, rääkige sellest oma raviarstile, kes määrab vajaduse korral Teile kerge toimega rahusti. Hirmu korral teavitage sellest ka uuringut tegevat radioloogiatehnikut.

Uuringu tegemise ajal jälgitakse Teid akna kaudu ja kaamera vahendusel ning ebamugavustunde korral saate radioloogiatehnikule märku anda turvanupu abil.

Uuringu õnnestumine eeldab liikumatult püsimist uuringu vältel. Selleks üritatakse saada asend võimalikult mugavaks.

Uuringu ajal kuuldub seadmest tugevat häält, seetõttu antakse Teile kõrvakaitsmed.

Pärast uuringut

Ülejäänud päeva jooksul tuleks vältida liigset koormust, nagu näiteks raske füüsiline töö, trenn või muu koormav tegevus.

Plaastri eemaldada ja duši all käia võite järgmisel päeval. Süstimisest põhjustatud põletikud on eriti harvad, aga kui tekib palavik, naha punetus või tugev valu, võtke ühendust saatva osakonna või perearstiga või pöörduge erakorralise meditsiini osakonda.

Uuringu tulemusest kuulete oma raviarstilt. Kui Teil ei ole kokku lepitud vastuvõtu- või helistamisaega, võtke ühendust suunava osakonnaga.