

MRT ehk magnetuuring

Pea, kael, lüli- ja jäsemed, rindkere, liigesed või veresooned

Ettevalmistuste tõttu saabuge uuringule **15 minutit enne broneeritud aega**.

Uuring kestab 30–60 minutit.

Enne uuringut

- Võite süüa ja juua tavapäraselt ja võtta igapäevaselt tarvitavad ravimid
- Ärge paigaldage ravimplaastrit (nt nikotiinplaaster, valuvaigistiplaaster)
- Ehted ja needid tuleb ära võtta, parem on need jätta koju
- Pea piirkonna uuringul ei tohi kasutada silmameiki
- Pange selga midagi kerget ja mugavat, mida on lihtne ära võtta

Uuringu ajal

Magnetuuringul (MRT) saadakse inimkehast täpseid anotoomilisi kujutusi tugeva magnetvälja abil. Uuringuks ei kasutata ioniseerivat ehk röntgenkiirgust. Uuring on valutu ja võimaldab diagnoosida mitmeid haigusi. Uuring teostatakse tunnelilaadses seadmes, mis on mõlemast otsast avatud, ventileeritud ja valgustatud ruum.

NB! Kui Teil on klaustrofoobia ehk kinnise ruumi kartus või ärevus, rääkige sellest oma raviarstile, kes määrab vajaduse korral Teile kerge toimega rahusti. Hirmu korral teavitage sellest ka uuringut tegevat radioloogiatehnikut.

Uuringu tegemise ajal jälgitakse Teid akna kaudu ja kaamera vahendusel ning ebamugavustunde korral saate radioloogiatehnikule märku anda turvanupu abil.

Uuringu õnnestumine eeldab liikumatult püsimist uuringu vältel. Selleks üritatakse saada asend võimalikult mugavaks. Vajadusel võidakse Teile anda hingamisjuhiseid. Hinge kinnihoidmised kestavad umbes 10–20 sekundit korraga.

Uuringu ajal kuulduv seadme tugevat häält, seetõttu antakse Teile kõrvakaitsmed.

Vajadusel süstitakse uuringul veeni kontrastainet, mis ei sisalda joodi. Allergilisi reaktsioone esineb väga harva. Kontrastaine eritub organismist neerude kaudu, soovitatav on pärast uuringut tarvitada tavalisest rohkem vedelikku.

Pärast uuringut

Uuringu tulemusest kuulete oma raviarstilt. Kui Teil ei ole kokku lepitud vastuvõtu- või helistamisega, võtke ühendust suunava osakonnaga.